

AllTest Chlamydia Schnelltest

DER SCHNELLTEST ZUM NACHWEIS EINER
CHLAMYDIEN-INFEKTION

EINFACH UND SCHNELL

Ergebnis liegt innerhalb von nur 10 Minuten vor

OBJEKTIVE ERGEBNISSE

Im Gegensatz zur Mikroskopie ohne lebende
Organismen

EXAKT UND ZUVERLÄSSIG

Ergebnis vergleichbar mit PCR

AllTest Chlamydia Schnelltest

Produktinformationen

Inhalt	25 Testkassetten 25 sterile Tupfer 25 Extraktionsröhrchen 25 Tropfspitzen 1 Reagenz A 1 Reagenz B 1 Arbeitsstation
--------	--

Bestellnummer	500.10015
---------------	-----------

femteva®
DIE METHODE IHRER WAHL

femteva UG
Mittelgewannweg 27
69123 Heidelberg
Tel.: +49 (0)6221.321937-0
www.femteva.de
info@femteva.de

DIAGNOSE

femteva®



AllTest Chlamydia Schnelltest



DER SCHNELLTEST ZUM NACHWEIS VON
CHLAMYDIA TRACHOMATIS-ANTIGENEN



Chlamydiose

DIE HÄUFIGSTE BAKTERIELLE STI

Als häufigste bakterielle sexuell übertragbare Erkrankung (STI) verursachen Chlamydien weltweit über 101 Millionen Neuinfektionen pro Jahr.

Die Prävalenz reicht in Deutschland von 6% bis 20% in Abhängigkeit der untersuchten Bevölkerungsgruppe. Tendenziell nimmt die Infektionsrate mit der Anzahl der Sexualpartner zu.

Die Chlamydiose verläuft bei der Frau zu Beginn oft asymptomatisch, da sie primär die Zervixschleimhaut betrifft. Spätestens jedoch mit dem Befall der Bartholin-Drüsen oder der Urethra wird die Infektion symptomatisch.

KLINISCHE SYMPTOMATIK DER CHLAMYDIEN-INFEKTION

GENITALE CHLAMYDIEN-INFEKTION DER FRAU

Die auf die Zervixschleimhaut begrenzte Primärinfektion verläuft zu 80% asymptomatisch. Breitet sie sich unbehandelt jedoch ins Endometrium, in die Tuben oder ins Peritoneum aus, äußert sie sich zumeist in Form einer schmerzhaften Salpingitis oder Endometritis, seltener auch als Perihepatitis.

GENITALE CHLAMYDIEN-INFEKTION DES MANNES

Im Gegensatz zur Frau manifestiert sich die Chlamydiose beim Mann zu 50% als symptomatische Urethritis. Typische Zeichen sind ein schmerzhaftes Druckgefühl, Brennen beim Wasserlassen und ein eitriges Fluor. Steigt die Infektion unbehandelt auf, entwickelt sich sehr schmerzhaft Prostatiden und Epididymitiden.

CHLAMYDIEN-INFEKTION DES NEUGEBORENE

Bei 60-70% der mit Chlamydien infizierten Schwangeren kommt es während der Geburt zu einer Übertragung der Erreger auf das Neugeborene. Neben einer häufig eintretenden Chlamydien-assoziierten Konjunktivitis oder Otitis media können auch schwerwiegende Pneumonien des Neugeborenen die Folge sein, sofern dieser während des Geburtsvorgangs erregerrhaltiges Vaginalsekret aspiriert.



KOMPLIKATIONEN EINER CHLAMYDIEN-INFEKTION

ERHÖHTES HIV- UND STI-RISIKO

Eine bestehende Chlamydien-Infektion erhöht das Risiko für die Infektion mit HIV oder weiteren sexuell übertragbaren Erkrankungen.

AUFSTEIGENDE INFEKTIONEN

Wird eine primäre Chlamydien-Infektion nicht erkannt und rechtzeitig behandelt, kann sie bei der Frau in Endometrium und Tuben und beim Mann in Hoden und Prostata aufsteigen. Dort verursacht sie äußerst schmerzhaft Entzündungen – bis hin zur Sterilität.

CHLAMYDIEN-ASSOZIIERTE REAKTIVE ARTHRITIS

Bei 1-5% aller Chlamydien-Infektionen entwickelt sich eine reaktive Arthritis, die bevorzugt die großen Gelenke der unteren Körperhälfte betrifft (Hüft-, Knie-, Sprunggelenke, seltener Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenke). Der Pathomechanismus dieser Gelenkentzündung ist noch nicht vollständig erforscht.



ALLTEST CHLAMYDIA

Der AllTest Chlamydia Schnelltest erlaubt eine rasche und sichere Diagnose einer Chlamydien-Infektion von Mann und Frau.

Die Handhabung des AllTest Chlamydia Schnelltests ist einfach und selbsterklärend und das Ergebnis liegt innerhalb von nur 10 Minuten vor. Dies ermöglicht eine sofortige Behandlung des Patienten bereits während des Erstbesuchs.