

AllTest Gonorrhoe Schnelltest

DER SCHNELLTEST ZUM NACHWEIS EINER
GONOKOKKEN-INFEKTION

EINFACH UND SCHNELL

Ergebnis liegt innerhalb von nur 10 Minuten vor

OBJEKTIVE ERGEBNISSE

Im Gegensatz zur Mikroskopie ohne lebende
Organismen

EXAKT UND ZUVERLÄSSIG

Ergebnis vergleichbar mit der Kultur

AllTest Gonorrhoe Schnelltest

Produktinformationen

Inhalt	25 Testkassetten 25 sterile Tupfer 25 Extraktionsröhrchen 25 Tropfspitzen 1 Reagenz A 1 Reagenz B 1 Arbeitsstation
--------	--

Bestellnummer 500.10016

femteva®
DIE METHODE IHRER WAHL

femteva UG
Mittelgewannweg 27
69123 Heidelberg
Tel.: +49 (0)6221.321937-0
www.femteva.de
info@femteva.de

DIAGNOSE

femteva®



AllTest Gonorrhoe Schnelltest



DER SCHNELLTEST ZUM NACHWEIS VON
NEISSERIA GONORRHOEAE-ANTIGENEN



Gonorrhoe (Tripper)

DIE DRITTHÄUFIGSTE STI

Mit etwa 90 Millionen Neuinfektionen pro Jahr stellt die Gonorrhoe (Tripper) weltweit die dritthäufigste sexuell übertragbare Erkrankung (STI) dar.

In Deutschland treten jährlich etwa 15.000–20.000 Neuinfektionen mit *Neisseria gonorrhoeae* auf. Speziell junge Menschen, SexarbeiterInnen und Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) sind besonders gefährdet, an einer Gonorrhoe zu erkranken.

Die Gonokokken befallen je nach Sexualkontakt die Vagina, die Urethra, das Rektum oder den Rachen. Die Infektion verläuft insbesondere bei der Frau häufig asymptomatisch, was eine Gefahr für aufsteigende Infektionen sowie ein Reservoir für die Weiterverbreitung der Erreger darstellt.

KLINISCHE SYMPTOMATIK DER GONORRHOE

GENITALE GONORRHOE DER FRAU

Die auf die Zervixschleimhaut begrenzte Primärinfektion äußert sich hauptsächlich durch vermehrten Fluor sowie gelegentlich mit zusätzlicher Begleit-Urethritis, Menorrhagien oder Zwischenblutungen. Bei etwa 50% der Frauen verläuft die Erkrankung jedoch asymptomatisch.

GENITALE GONORRHOE DES MANNES

Eine schmerzhafte Urethritis mit teils massivem eitrigem Fluor ist das Leitsymptom einer Gonokokken-Infektion des Mannes. Unbehandelt besteht die Gefahr eines Übertritts der Erreger auf Hoden und Prostata.

REKTALE GONORRHOE

Bei der Frau selten symptomatisch, so äußert sich die rektale Gonorrhoe beim Mann häufig mit analem Pruritus bis hin zu den klassischen Zeichen einer Proktitis.

PHARYNGEALE GONORRHOE

Pharyngeale Gonokokken-Infektionen sind meist symptomlos. Daher stellt der Rachen ein wichtiges Infektionsreservoir dar.

DISSEMINIERTE GONOKOKKEN-INFEKTION (DGI)

In bis zu 3% aller lokaler Gonorrhoe-Fälle kommt es im Verlauf der Erkrankung zu einer disseminierten Gonokokken-Infektion. Diese systemische Infektion betrifft hauptsächlich Frauen und ist durch das Symptom-Trias „Fieberschübe-akute Polyarthritiskral lokalisierte, vaskulitische Hauterscheinungen mit splitterförmigen Hämorrhagien“ gekennzeichnet.

KOMPLIKATIONEN EINER GONOKOKKEN-INFEKTION

ERHÖHTES HIV- UND STI-RISIKO

Eine bestehende Gonokokken-Infektion erhöht das Risiko für die Infektion mit HIV oder weiteren sexuell übertragbaren Erkrankungen.

AUFSTEIGENDE INFEKTIONEN

Wird eine primäre Gonokokken-Infektion nicht erkannt und rechtzeitig behandelt, kann sie bei der Frau in Endometrium und Tuben und beim Mann in Hoden und Prostata aufsteigen. Dort verursacht sie äußerst schmerzhafte Entzündungen – bis hin zur Sterilität.

SEPTISCHER ABORT UND ERHÖHTES FRÜHGEBURTS-RISIKO

Eine Gonorrhoe während der Schwangerschaft kann zu schwerwiegenden Komplikationen wie einer Frühgeburt oder einem septischen Abort führen. Die perinatale Übertragung der Erreger auf das Neugeborene führt unbehandelt zu einer Ophthalmoblenorrhoea neonatorum, die eine Erblindung des Kindes zur Folge haben kann.



ALLTEST GONORRHOE

Der AllTest Gonorrhoe Schnelltest erlaubt eine rasche und sichere Diagnose einer Gonokokken-Infektion von Mann und Frau.

Die Handhabung des AllTest Gonorrhoe Schnelltests ist einfach und selbsterklärend und das Ergebnis liegt innerhalb von nur 10 Minuten vor. Dies ermöglicht eine sofortige Behandlung des Patienten bereits während des Erstbesuchs.